Ambar
ANÀLISIS MÈDIQUES
BARCELONA

(124237) **HEPARINA , ACTIVIDAD ANTI-Xa EN PLASMA**

Muestra:	**PLASMA (Anticoagulante: CITRATO 3.8 % DIL 1/9)**
Muestra alternativa:	**No tiene**
Volumen mínimo:	**1.25 mL** Conservación de la muestra: **Congelada a -20ºC**
Plazo de entrega:	**7 dias laborables**
Metodo:	**Medida de la actividad anti Factor X activado. Cronométrico.**
Otros nombres:	**HEPARINA , ACTIVIDAD ANTI-Xa EN PLASMA**

Obtención de la muestra:

Separar plasma pobre en plaquetas y congelar inmediatamente.Lo recomendable es obtener la muestra de plasma a las 3 h de la última dosis de HBPM.

Observaciones:

Es recomendable saber el tipo y la dosis de heparina asi como la hora de extracción.

HEPARINA , ACTIVIDAD ANTI-Xa EN PLASMA

Método: Medida de la actividad anti Factor X activado. Cronométrico.

RESULTADO: **R1** UI/mL

VALORES DE REFERENCIA:
Pacientes en tratamiento con
100-120 UI/Kg de HBPM / 12 h.
A las 3 - 4 horas última dosis: 0.50 - 1.00 UI/mL