

(103100) **Proteína A Asociada al Embarazo [papp-a] en suero**

Muestra: **SUERO**
Muestra alternativa: **PLASMA (Anticoagulante: HEPARINA)**
Volumen mínimo: **400 µL** Conservación de la muestra: **Refrigerada**
Plazo de entrega: **3 días laborables**
Metodo: **Quimioluminiscencia.**

Otros nombres: **Papp-a en suero**

Condiciones del paciente:

Indicar en la petición las semanas de embarazo.

Nota:

La determinación de PAPP-A durante el primer trimestre de embarazo tiene interés para la detección precoz de síndrome de Down. A partir de los valores de PAPP-A y Beta-HCG libre, es posible realizar el cálculo del índice de riesgo.

Proteína A Asociada al Embarazo [papp-a] en suero

Método: Quimioluminiscencia.

RESULTADO: **R1** mUI/mL

VALORES DE REFERENCIA:

Embarazo.	Valor medio (*)
8 semanas:	0.49 mUI/mL
9 semanas:	0.73 mUI/mL
10 semanas:	1.08 mUI/mL
11 semanas:	1.60 mUI/mL
12 semanas:	2.36 mUI/mL
13 semanas:	3.50 mUI/mL

(*) El valor medio, se re-calcula estadísticamente cada 6 meses.

Nota: La determinación de PAPP-A durante el primer trimestre de embarazo tiene interés para la detección

precoz de síndrome de Down. A partir de los valores de PAPP-A y Beta-HCG libre, es posible realizar el cálculo del índice de riesgo.
